

حیوانات کے امراض کیلئے

کیوریٹو ویٹو پیٹھک ادویات



مہریت

بے ضرر

منہر

کیوریٹو ویٹرنری (پرائیویٹ) لمیٹڈ



CURATIVE

Tel Sales: 047-6214576, Head Off: 047-5005255
Fax: 047-6212299

فہرست ادویات

(A) دووعل جانوروں کیلئے ادویات

سولفر	نام ادویات	پیکٹ	مقدار	قیمت
11	فلیکونورڈک	پیکٹ	10 گرام	20.00
11	اکسیرتھر	پیکٹ	8 گرام	15.00
11	مڈکھرڈک	پیکٹ	10 گرام	20.00

(E) جلدی امراض کیلئے ادویات

12	اکسیر جلد (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
12	اکسیر چھڑی (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
4	ایکٹیو سیلک اسٹیکٹ	ڈبلی	20 گرام	30.00
12	اکسیر ٹنگرین (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00

(F) متفرق امراض کیلئے ادویات

13	کیرنڈ (اکسیر بخار)	پیکٹ	8 گرام	15.00
13	اکسیر بک کپور	کپور	12 کپور	75.00
14	اکسیر چشم	پیکٹ	8 گرام	10.00
14	اکسیر چھٹ (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
14	اکسیر دھ کپور	کپور	12 کپور	75.00
14	اکسیر بک کپور	کپور	20 کپور	100.00
14	اکسیر بک (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
15	اکسیر کھالے دھک	30 گرام 40	120ML	100.00
15	اکسیر کھالی	پیکٹ	8 گرام	15.00
15	اکسیر گری	پیکٹ	8 گرام	15.00
16	اکسیر نمونہ دھک	پیکٹ	8 گرام	15.00
13	زبان دھیر باد کپور	کپور	کپور	75.00
13	تاک گریڈ	پیکٹ	100 گرام	100.00
15	اکسیر حراج	پیکٹ	8 گرام	15.00

(G) گھوڑوں کی امراض کیلئے ادویات

16	اکسیر آب بھر	پیکٹ	10 گرام	20.00
16	اکسیر کھار (نفس)	پیکٹ	10 گرام	20.00
16	اکسیر حلا	پیکٹ	10 گرام	20.00

(H) جانوروں کی صحت اور دیکھ بھال کیلئے ہدایات

(مئی 17-19)

سولفر	نام ادویات	پیکٹ	مقدار	قیمت
4	اکسیر پستان	پیکٹ	8 گرام	15.00
4	اکسیر خراب (دودھ لیسوا)	پیکٹ	10 گرام	15.00
4	اکسیر دھ کر لیتھ	پیکٹ	100 گرام	100.00
4	اکسیر دھ پستان (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
5	اکسیر گر کھ پستان	پیکٹ	8 گرام	15.00
5	کیوریل آئل	ڈرام	30ML	30.00
5	اکسیر گلنی ریتار، اکسیر	کپور	40 کپور	
5	اکسیر بک فلو	پیکٹ	8 گرام	15.00

(B) امراض افزائش نسل کیلئے

8	اکسیر بر صحت	پیکٹ	8 گرام	15.00
6	اکسیر سبیل ولادت	پیکٹ	8 گرام	15.00
7	اکسیر بھر گرینڈ	پیکٹ	50 گرام	15.00
7	اکسیر حمل (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
7	اکسیر دم (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
8	اکسیر بھاس	پیکٹ	8 گرام	15.00

(C) نظام انہض کے امراض کیلئے ادویات

8	اکسیر بھارہ	پیکٹ	8 گرام	15.00
0	اکسیر بھش (قوت)	پیکٹ	8 گرام	15.00
8	اکسیر غولی دپش	پیکٹ	8 گرام	15.00
9	اکسیر دھ دھادی	پیکٹ	8 گرام	15.00
9	اکسیر گدی پھڑ	پیکٹ	8 گرام	15.00
9	اکسیر مٹی پھڑ (نمبردار)	پیکٹ	10 گرام	15.00
9	اکسیر دھ کپور	کپور	12 کپور	75.00
10	دھ روک	پیکٹ	10 گرام	20.00
10	اکسیر ہسم گرینڈ	پیکٹ	100 گرام	100.00

(D) مہلک اور وبائی امراض کیلئے ادویات

10	اکسیر اعظم	پیکٹ	8 گرام	15.00
10	اکسیر بک کپور	کپور	30 کپور	120.00
11	اکسیر گل کھار	پیکٹ	8 گرام	15.00

حیوانات کے امراض کیلئے "کیوریٹو" ہومیو پیتھک ادویات

ہومیو پیتھی کی روز افزوں ترقی اور عوام و خواص میں اس کی انتہائی مقبولیت اب صرف انسانی علاج معالجے کی حد تک محدود نہیں رہی۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں (Homoeopathy in Veterinary Practice) یعنی "ہومیو پیتھک ادویات سے حیوانات کا علاج" کا مضمون بہت ایڈوانس ہو چکا ہے۔

پاکستان میں کیوریٹو میڈیسن کمپنی 1961ء سے حیوانات کی امراض کیلئے بفضلہ تعالیٰ مفید ہومیو پیتھک مرکبات مارکیٹ میں پیش کر رہی ہے۔ یہ ادویات:-

1- فوری اثر ہیں اور مرض کی مکمل تہہ کنی کرتی ہیں۔

2- تجویز کرنا عام آدمی کیلئے بھی بہت آسان ہے۔ کیونکہ تشخیص کیلئے عام فہم علامات لکھ دی گئیں ہیں

3- بد اثرات (Side Effects) سے پاک ہیں۔ مگر ادویات کے برعکس ان ادویات سے جانوروں کے دودھ، گوشت اور اندروں پر کوئی مضر اثر نہیں پڑتا

4- کھلائی بہت آسان ہیں۔ روٹی یا آسنے میں لپیٹ کر کھلائی جاسکتی ہیں یا دیہے ہی جانور کے منہ میں ڈال دیں۔

5- دیگر طریقہ ہائے علاج کی نسبت سستی ہیں۔

6- رسالہ میں درج ادویات کے علاوہ بھی مختلف امراض کے نسخہ جات موجود ہیں۔ اگر کوئی بیماری مندرجہ بیماریوں کے علاوہ بھی ہو اور اس مرض کیلئے آپ دوا حاصل کرنا چاہیں تو ہیڈ آفس رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ دوا آپ کو خدمتاً بھجوا دی جائے گی۔

ترکیب استعمال:

ہر دوا کے ساتھ ترکیب استعمال درج ہے مرض کی شدت اور نوعیت کے مطابق دو گمانے کا درمیانی وقفہ حسب ضرورت کم یا زیادہ کیا جاسکتا ہے۔ نیز اگر کسی جانور میں ایک سے زیادہ بیماریوں کی علامت موجود ہوں تو ان بیماریوں کی ادویات اکٹھی استعمال کروائی جاسکتی ہیں۔ چھوٹے جانوروں مثلاً کتوں، چھتروں اور بھیڑ بکری کو دوائی کی آدھی مقدار (یعنی آدھا پیکٹ یا ایک کپسول فی مرتبہ) استعمال کروائیں۔

(A)۔ دودھ مل جانوروں کیلئے ادویات

TREATMENT OF UDDERS AND TEATS

اینٹی سپٹک آئینٹمنٹ

تھنوں اور حیوانہ پو لگانے کا مرہم
An antiseptic ointment for teats.

چوٹ، موسم کی شدت اور دیگر وجوہات سے تھنوں اور حیوانہ کے پھٹنے اور پیدا شدہ زخموں وغیرہ پر لگانے کی مفید دوا ہے۔ جو زخم کو انفیکشن سے بچا کر تھنوں اور حیوانہ کو صحت مند رکھتی ہے۔ حسب ضرورت صبح دو پہر شام لگائیں۔

اکسیر پستان

تھنوں اور حیوانہ کی نشوونما کیلئے
For undeveloped or retarded udders and teats

بعض جانوروں کے پستان اور حیوانہ پوری نشوونما نہیں پاتے اور ان میں دودھ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات بار سوز کی کمی، خوراک کی کمی اور موزوٹی (نسلی) اسباب ہیں۔ نیز بعض جانوروں میں کسی بیماری کے بعد تھن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور دودھ کم ہو جاتا ہے۔ ایسے جانوروں کو "اکسیر پستان" ہر دوسرے دن ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً دس بارہ ٹیکس کافی ہوتے ہیں۔ علاوہ انہیں دودھ کی کمی پوری کرنے کیلئے روزانہ "اکسیر دودھ گریٹوٹ" کھلائیں۔

اکسیر خرابی دودھ

دودھ کی خرابی کیلئے
For abnormality of milk

دودھ میں ماسٹکلیاں، ٹون کی آمیزش اور رنگ یا ذائقہ کی تبدیلی وغیرہ دراصل تھنوں یا حیوانہ پر چوٹ لگنے یا جراثیم کی انفیکشن کی علامت ہے۔ وقت پر دیکھ نہ دوڑنے اور گدی سے بھی یہ انفیکشن ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں "اکسیر خرابی دودھ" حسب ضرورت بارہ ٹیکس کھانے کے وقت سے نمبر وار ایک ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً آٹھ ٹیکس کافی ہوتے ہیں۔ اگر تھنوں یا حیوانہ پر سوزش بھی ہو تو "اکسیر خرابی دودھ" کے ہر پیکٹ کے ساتھ نمبر وار ایک ایک پیکٹ "اکسیر سوزش پستان" بھی کھلائیں۔ مناسب ہے کہ مرض کی مکمل علاج کیلئے ایک "ڈپل" "اکسیر گلی پستان کپسولز" بھی استعمال کرادیں۔ خراب دودھ کو دھتے وقت لازماً تھنوں سے نکال دینا چاہیے۔ نیز تھنوں کی صفائی کا خیال بھی رکھیں۔

اکسیر دودھ گریٹوٹ

کمی دودھ کیلئے
For decrease in milk production

دودھ کی کمی کی بہت سی وجوہات ہیں مثلاً موزوٹی (نسلی) اسباب، سونے کے بعد میلاں پھینکنا، خوراک کی کمی، ہیٹ اور ٹیک کے کینے، موسم کی شدت، پانی کی کمی، تھنوں کی خرابی اور کوئی بیماری وغیرہ۔ جس جانور کا دودھ کم ہوا ہے "اکسیر دودھ گریٹوٹ" صبح و شام 10 گرام فی خوراک کھلائیں۔ عموماً آٹھ سے دس خوراکیں کافی ہیں۔ لیکن دودھ کی کمی کی مذکورہ وجوہات کا تدارک اور علاج بھی لازمی ہے۔

اکسیر سوزش پستان

تھنوں اور حیوانہ کی سوزش (سازو) کیلئے
For acute mastitis i.e. inflammation of udder & teats

تھنوں اور حیوانہ کی سوزش کی وجوہات بیکٹیریا اور وائرس کی انفیکشن، چوٹ اور زخم ہیں۔ لہذا جانور کو صاف ستھری اور آرام دہ جگہ پر رکھنا چاہیے۔ نیز دھم صفائی، وقت پر دودھ نہ دوڑنے اور انگوٹھا دھرا کر کے دودھ نکالنے سے بچنا ضروری ہے۔

سوزش اور انفیکشن ہو سکتی ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر سوزش پستان" نمبر وار ایک ایک پکٹ حسب ضرورت بارہ بار پونہ گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ عموماً آٹھ پکٹیں کافی ہوتے ہیں۔ اگر سوزش کیساتھ دودھ میں مٹھکیاں وغیرہ بھی ہوں تو "اکسیر سوزش پستان" کے ہر پکٹ کے ساتھ "اکسیر خرابی دودھ" بھی نمبر وار ایک ایک پکٹ کھلائیں۔ خراب دودھ تھنوں سے لازماً نکال دیں لیکن کوئی چیز مثلاً پرندے کا پر یا تنکا وغیرہ ہرگز تھن میں داخل نہ کریں اور مرض کی مکمل بیخ کنی کیلئے ایک ڈبی "اکسیر گلٹی پستان کپسولز" بھی استعمال کرادیں۔ اگر تھنوں پر کوئی ظاہری زخم وغیرہ بھی ہو تو "کیوریٹو آئل" یا اینٹی سپٹک آکٹینٹ لگائیں۔ (ییزو دیکھیں "اکسیر گلٹی پستان کپسولز")

اکسیر کریک پستان
تھنوں کے پھٹنے اور السرو وغیرہ کیلئے
For cracked or chapped teats

موسم کی شدت اور دیگر وجوہات کے باعث بعض اوقات جانور کے تھنوں کی جلد پھٹ جاتی ہے اور اس سے تھوڑا سا خون رستا ہے۔ ایسی صورت میں "اکسیر کریک پستان" بارہ بارہ گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ عموماً چار یا آٹھ پکٹیں کافی ہیں۔ نیز تھنوں پر صبح شام "کیوریٹو آئل" یا اینٹی سپٹک آکٹینٹ لگائیں اور صفائی کا خیال رکھیں۔

کیوریٹو آئل
تھنوں اور جلد کے زخموں کیلئے
A healer of skin and teats

تھنوں کے پھٹنے، ہر قسم کے زخموں اور دیگر جلدی امراض مثلاً خارش اور ایگزیم وغیرہ پر لگانے کیلئے مفید آئل ہے۔

اکسیر گلٹی پستان کپسولز
تھنوں اور حیوان کی گلیوں، نازوں، منہ سڑی اور رسولی وغیرہ کیلئے
For chronic or fibrotic mastitis.

تھنوں یا حیوان کی گلیاں اور نازیں وغیرہ دراصل "کابرسٹوز" ہیں۔ جو انفیکشن، سوزش اور چوٹ وغیرہ کے بعد درست علاج نہ ہونے کے باعث پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے حیوان میں دودھ کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر گلٹی پستان کپسولز" دن میں چار یا پانچ دفعہ ایک ایک کپسول کھلائیں، اور تریاق زہر بار روزانہ دودھ کپسولز آٹھ دن تک کھلائیں۔ اگر تھنوں یا حیوان پر سوزش بھی ہو تو "اکسیر سوزش پستان" صبح شام ایک ایک پکٹ کھلائیں۔ متاثرہ تھن میں سے دودھ ہتے وقت دودھ ضرور نکال دینا چاہیے لیکن تھن میں کوئی چیز مثلاً پرندے کا پر یا تنکا وغیرہ داخل نہیں کرنا چاہیے اگر دودھ نکالنا بہت مشکل ہو تو دودھ نکالنے کی ٹالی (Milk Syphon) جراثیم سے پاک کر کے اس پر "کیوریٹو آئل" لگا کر تھن سے دودھ نکالیں۔ مکمل آرام آنے تک علاج جاری رکھیں۔

اکسیر مزاج
بدمزاج صندی اور غصیلے جانوروں کیلئے
For ill tempered animals.

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "متفرق امراض کیلئے ادویات"

اکسیر ملک فیور
دودھل جانوروں میں کیلشیم کی کمی سے فالجی کیفیت کیلئے
For milk fever, hypocalcemia

مرض بہت زیادہ دودھ دینے والی کائے بھینسوں میں ہونے کے بعد ہوتا ہے جب کہ دودھ کے ذریعے یکدم جسم سے بہت سا کیلشیم نکل جائے۔ پہلے بھوک اور دودھ یکدم کم ہو جاتا ہے اور پھلپھلی تانگیں آنکڑ جاتی ہیں۔ پھر جانور لیٹ

جاتا ہے اور اٹھ نہیں سکتا۔ سر موڑ کر پیلا (دھکی) کے ساتھ نکالیں گے گوبر اور پیشاب بند ہو جاتا ہے، جسم شفاف پڑ جاتا ہے اور آنکھیں پھرا جاتی ہیں ایسی صورت میں جانور کو "اکسیر نکس" مرض کی شدت کے مطابق آدھ گھنٹہ، گھنٹہ یا دو گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفے سے حسب ضرورت کھلائیں۔ جانور کو دودھ میں گلوکوز یا کیکاشیم کی گولیاں ملا کر پلان بھی مفید ہے۔ لیکن یہ خیال رکھیں کہ دودھ سانسی کی نالی میں نہ چلا جائے۔ مکمل آرام آنے تک علاج جاری رکھیں۔

سونے کے بعد جانور کی اندرونی صفاتی (میلا پھینکنے) کیلئے
For Complete Discharge of Lochia

اکسیر نفاس

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "امراض افزائش نسل کیلئے ادویات"

(B)۔ امراض افزائش نسل کیلئے

TREATMENT OF THE DISEASES OF REPRODUCTIVE SYSTEM

پرمسوتی بخار اور سونے کے بعد انفیکشن کیلئے

For post natal septecemia and infection of the uterus etc

اکسیر پرسوت

بچہ دینے کے بعد جانور کے رحم کی پوری صفائی نہ ہونے سے سپٹک مادہ (گلا سٹراز ہریلا مواد) پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے جراثیم خون میں شامل ہو کر جانور کو پرسوتی بخار ہو جاتا ہے۔ ٹیسر پچر بڑھ جاتا ہے، جانور کھانا پینا اور چٹائی بند کر دیتا ہے، کانپتا ہے، جسم کو جھکے لگتے ہیں اور جانور اٹھ نہیں سکتا، آنکھ کی جھلی، منہ اور مقعد کی میوکس ممبرین میں خون کے دھبے نظر آتے ہیں۔ ایسے جانور کو "اکسیر پرسوت" مرض کی شدت کے مطابق آدھ گھنٹہ، ایک گھنٹہ، چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفے سے حسب ضرورت کھلائیں۔ نوٹ: تندرست جانور کو پرسوت، انفیکشن اور دیگر مسائل سے حفظ مانتھم کیلئے سونے کے بعد "اکسیر نفاس" صبح شام ایک ایک پیکٹ تین دن تک کھلائیں۔

رحم یا جسم کے کسی حصے میں انفیکشن اور سوزش کیلئے

For Septicemia, Metritis, Vaginitis, Mastitis & other Infections

تریاق زہر باد کپسولز

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "مفرق امراض کیلئے ادویات"

اکسیر تسہیل ولادت

بچہ دینے (سونے) میں دقت اور تکلیف کیلئے

For Dystocia

بعض اوقات جانور کو سونے میں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت دیر لگتی ہے لیکن بچہ باہر نہیں آتا۔ اس کی وجوہات میں جانور کی کمزوری، رحم کی حرکات میں کمی، رحم کا منہ بند ہونا اور رحم میں بچہ کی پوزیشن درست نہ ہونا وغیرہ ہیں۔ ایسی صورت میں جانور کو "اکسیر تسہیل ولادت" حسب ضرورت دس منٹ سے تیس منٹ کے وقفے سے دو چار خوراکیں کھلائیں۔ بفضلہ تعالیٰ چار پانچ پیکٹس کھلانے سے بچہ باہر آ جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو امکان ہے کہ بچہ مارل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جانوروں کے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سونے کیلئے بچے کو بہت زور سے کھینچنا اور جھکے مارنا مان کیلئے سخت نقصان دہ ہے۔

اکسیر جیر گریوٹز

جیر (آئول) نہ گرانے کی تکلیف کیلئے

For retention of placenta

جانور کو سونے کے بعد بارہ گھنٹہ کے اندر جیر گرا دینی چاہیے۔ لیکن بعض جانور وقت پر جیر نہیں گراتے۔ ایسی صورت میں اکسیر جیر گریوٹز دو، دو گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ عموماً پانچ سے دس پیکٹس کافی ہیں۔ چوبیس گھنٹے تک جیر نہ گرانے سے انفیکشن ہو سکتی ہے اس صورت میں "تریاق زہر باد کپسولز" دن میں تین دفعہ ساتھ کھلائیں۔ اگر کسی جانور کا بچہ پیٹ میں مر جائے تو اسے نکالنے کیلئے "اکسیر جیر گریوٹز" دو، دو گھنٹے کے وقفہ سے اور "تریاق زہر باد کپسولز" چھ چھ گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ نوٹ: جیر کو زبردستی کھینچ کر نہیں نکالنا چاہیے اس سے جانور کے رحم اور دودھ کی پیدائش کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کسی جانور میں جیر کا مسئلہ ہر دفعہ پیدا ہو جائے تو اسے سونے کے بعد چھ ماہ سے پہلے حمل نہیں کرنا چاہیے۔

اکسیر حمل

مادہ جانوروں کے بانجھ پن کیلئے

For infertility of female animals

بعض مادہ جانور گرم نہیں ہوتے یا ان کا حمل ٹھہر جاتا ہے، اس کی وجوہات جانور کی کمزوری، حد سے زیادہ موٹاپا، رحم کی کمزوری اور نظام تولید کی انفیکشن وغیرہ ہیں۔ ایسے جانور کو "اکسیر حمل" چار پیکٹس (روزانہ ایک پیکٹ نمبر وار) کھلانا کافی ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہو تو دو ہفتہ کے بعد پھر چار پیکٹس کھلانے سے بفضلہ تعالیٰ مادہ جانور گرم ہو جائیگی۔ اگر نظام تولید کی انفیکشن ہو تو "تریاق زہر باد کپسولز" دو کپسولز روزانہ پانچ دن کھلائیں اور پھر "اکسیر حمل" کا ایک کورس (چار پیکٹس) کھلائیں اور زہر جانور کیساتھ رکھیں۔ گرم خوراک دیں وقت پر حاملہ کروائیں اور جانور کی صحت کا خیال رکھیں۔

اکسیر رحم

اوائس یا پیچھا نکالنے کیلئے

For prolapse of vagina and uterus

بعض مادہ جانور اوائس (اندرونی اعضاء) باہر نکالتی ہیں۔ اس کی وجہ اندرونی اعضاء اور پٹھوں کی کمزوری، پیٹ کے اعضاء کا رحم پر دباؤ اور انفیکشن وغیرہ ہیں۔ نیز اگر بچہ یا جیر کو زبردستی کھینچ کر باہر نکالا جائے تو سونے کے بعد یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر رحم" حسب ضرورت بارہ یا چوبیس گھنٹے کے وقفے سے نمبر وار کھلائیں۔ عموماً چار سے آٹھ پیکٹس کافی ہوتے ہیں۔ نیز "اکسیر رحم" کے ہر پیکٹ کے ساتھ "تریاق زہر باد کپسولز" کے دو کپسولز کھلائیں۔ جانور کو رسی کا چھکا (Truss) چڑھا دیں۔ پانی زیادہ پلائیں نرم غذا دیں اور پیٹ بھر کر ہرگز نہ کھلائیں۔ نیز جانور کو ڈھلوان سطح پر باندھیں تاکہ وہ آگے سے نیچا رہے اور اس کا پچھلا حصہ اونچا رہے۔

نوٹ: اوائس چڑھانا ہو تو کیورینو پھر کے 10 فیصد لوشن سے صاف کر کے صاف ہاتھوں سے احتیاط سے چڑھائیں۔

اکسیر ملک فیور

تفصیل کے لئے دیکھیں زیر عنوان "دودھل جانوروں کیلئے ادویات"

سودہ کے بعد نمکیات کی کمی سے فالجی کیفیت کیلئے

For hypocalcemia

اکسیر جیر گریوٹز

جیر (آنول) نہ گرانے کی تکلیف کیلئے

For retention of placenta

جانور کو سونے کے بعد بارہ گھنٹہ کے اندر جیر گرا دینی چاہیے۔ لیکن بعض جانور وقت پر جیر نہیں گراتے۔ ایسی صورت میں اکسیر جیر گریوٹز دو، دو گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ عموماً پانچ سے دس پیکٹس کافی ہیں۔ چوبیس گھنٹے تک جیر نہ گرانے سے انفیکشن ہو سکتی ہے اس صورت میں "تریاق زہر بادکپسولز" دن میں تین دفعہ ساتھ کھلائیں۔ اگر کسی جانور کا بچہ پیٹ میں مر جائے تو اسے نکالنے کیلئے "اکسیر جیر گریوٹز" دو، دو گھنٹے کے وقفہ سے اور "تریاق زہر بادکپسولز" چھ گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ نوٹ: جیر کو زبردستی کھینچ کر نہیں نکالنا چاہیے اس سے جانور کے رحم اور دودھ کی پیدائش کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کسی جانور میں جیر کا مسئلہ ہر دفعہ پیدا ہو جائے تو اسے سونے کے بعد چھ ماہ سے پہلے حمل نہیں کرنا چاہیے۔

اکسیر حمل

مادہ جانوروں کے ہانچہ پن کیلئے

For infertility of female animals

بعض مادہ جانور گرم نہیں ہوتیں یا ان کا حمل ٹھہرتا نہیں، اس کی وجوہات جانور کی کمزوری، حد سے زیادہ موٹاپا، رحم کی کمزوری اور نظام تولید کی انفیکشن وغیرہ ہیں۔ ایسے جانور کو "اکسیر حمل" چار پیکٹس (روزانہ ایک پیکٹ نمبر وار) کھلانا کافی ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہو تو دو ہفتہ کے بعد پھر چار پیکٹس کھلانے سے بفضلہ تعالیٰ مادہ جانور گرم ہو جائیگی۔ اگر نظام تولید کی انفیکشن ہو تو "تریاق زہر بادکپسولز" دو کپسولز روزانہ پانچ دن کھلائیں اور پھر "اکسیر حمل" کا ایک کورس (چار پیکٹس) کھلائیں اور نر جانور کیساتھ رکھیں۔ گرم خوراک دیں وقت پر حاملہ کروائیں اور جانور کی صحت کا خیال رکھیں۔

اکسیر رحم

اوانس یا پیچھا نکالنے کیلئے

For prolapse of vagina and uterus

بعض مادہ جانور اوانس (اندرونی اعضاء) باہر نکالتی ہیں۔ اس کی وجہ اندرونی اعضاء اور پٹوں کی کمزوری، پیٹ کے اعضاء کا رحم پر دباؤ اور انفیکشن وغیرہ ہیں۔ نیز اگر بچہ یا جیر کو زبردستی کھینچ کر باہر نکالا جائے تو سونے کے بعد یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر رحم" حسب ضرورت بارہ یا چوبیس گھنٹے کے وقفے سے نمبر وار کھلائیں۔ عموماً چار سے آٹھ پیکٹس کافی ہوتے ہیں۔ نیز "اکسیر رحم" کے ہر پیکٹ کے ساتھ "تریاق زہر بادکپسولز" کے دو کپسولز کھلائیں۔ جانور کو رسی کا چھکا (Truss) چڑھا دیں۔ پانی زیادہ پلائیں نرم غذا دیں اور پیٹ بھر کر ہرگز نہ کھلائیں۔ نیز جانور کو ڈھلوان سطح پر باندھیں تاکہ وہ آگے سے نیچا رہے اور اس کا پیچھا حصہ اونچا رہے۔

نوٹ: اوانس چڑھانا ہو تو کیورینٹینچر کے 10 فیصد لوشن سے صاف کر کے صاف ہاتھوں سے احتیاط سے چڑھائیں۔

سونے کے بعد نمکیات کی کمی سے فالجی کیفیت کیلئے

or hypocalcemia

اکسیر ملک فیور

تفصیل کے لئے دیکھیں زیر عنوان "دودھل جانوروں کیلئے ادویات"

اکسیر نفاس

صوت کے بعد جانور کی اندرونی صفائی (میلا پیہنکھ) اکیلے
For Complete Discharge of Lochia

بچہ دینے کے بعد جانور کے رحم سے ایک خاص قسم کی خون آمیز رطوبت کا اخراج ہوتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں۔ یہ رطوبت کم و بیش دس دن تک جاری رہتی ہے۔ اگر رحم سے اس رطوبت کا مکمل اخراج نہ ہو تو جانور میں بھوک کی کمی، کمزوری، بخار اور دودھ کی کمی وغیرہ واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر نفاس" صبح شام ایک ایک پیکٹ تین چار دن کھلائیں۔ نیز ہر جانور کو سونے کے بعد "اکسیر نفاس" صبح شام ایک ایک پیکٹ تین چار روز تک کھلانے سے پورا دودھ اترنے کے علاوہ انفیکشن اور دیگر مسائل کا تدارک بھی ہوتا ہے۔

(C)۔ نظام ہضم کے امراض کیلئے ادویات

TREATMENT OF THE DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

عمومی نوٹ: جانوروں کو صاف ستھرا تازہ پانی پلائیں اور تازہ صاف چارہ کھلائیں جو موسم کی شدت سے بہت گرم یا ٹھنڈا نہ ہوا ہو۔ ایک ہی قسم کے بجائے چارہ بدل بدل کر دیں اور بھوسہ (توڑی) بھی کھلائیں۔ کھری میں نمک رکھیں اور جانوروں کو کچھ دقت چرانے کیلئے کھلا بھی چھوڑا کریں۔

اکسیر اچھارہ

جانوروں کے پیٹ میں ہوا بھرنے (آپہرنے) کی دوا
For tympany

اچھارہ کا سبب نرم سبز چارہ مثلاً شفل، برسم، گلاسٹرا وغیرہ چارہ، نیز دانے اور روٹی کے ٹکڑے زیادہ کھا کر پانی پی لینا وغیرہ ہیں۔ اس سے پیٹ میں زہریلی گیسیں پیدا ہو کر جانور کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ جانور مشکل سے سانس لیتا اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مرض مہلک ہے۔ شدید خطرہ کی حالت میں پانچ منٹ کے وقفہ سے نسبتاً آرام میں چند دن منٹ یا ایک گھنٹے کے وقفہ سے "اکسیر اچھارہ" کھلائیں۔ عموماً دو تین پیکٹس بفضلہ تعالیٰ کافی ہیں۔ ایمر جنسی کی وجہ سے اس دوا کو ہر وقت جانوروں والے گھر میں موجود ہونا چاہیے۔

اکسیر بندش

پیشاب اور پاخانہ کی رکاوٹ اور پیٹ درد
For Colic, Impaction and Retention of Urine

پاخانہ اور پیشاب کی رکاوٹ، قبض اور پیٹ درد گھوڑوں اور ٹھچروں کے علاوہ مویشی میں بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ معدہ اور آنتوں کی کمزوری، خشک اور مقوی خوراک زیادہ کھا جانا، پانی کم پینا، گردے کی پتھری، گنداپانی اور ناقص چارہ کھانا وغیرہ ہیں۔ جانور بے چین ہوتا ہے۔ ٹانگ کو پیٹ پر اور زمین پر مارتا ہے اور پیشاب کیلئے زور لگاتا ہے۔ قبض کی صورت میں پیٹ پھول جاتا ہے۔ شدید تکلیف میں "اکسیر بندش" پندرہ پندرہ منٹ بعد اور نسبتاً آرام میں دو چار گھنٹے بعد کھلائیں۔ عموماً چھ سے آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ آرام آنے کے بعد جانور کو نرم اور زود ہضم خوراک دیں اور پانی زیادہ پلائیں۔

اکسیر خونی پیچش

پاخانہ میں خون اور بلغم (آؤں) وغیرہ آنے کی دوا
For Dysentery

انتریاہوں کے پیراسائٹس اور نظام ہضم کی خرابی کے باعث جانور کو پیچش کی دیگر علامات کے علاوہ گوبر میں جھاگ

لیندہ مواد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ خون بظاہر نظر نہیں آتا لیکن اس کی وجہ سے کچھ دیر بعد گوہر کی رنگت سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیرخونی پچش" صبح دوپہر شام ایک ایک پیکٹ دیں۔ عموماً چھ یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ پیٹ کے کیڑوں کی صورت میں "اکسیر کرم" استعمال کروائیں۔

بیٹ میں ہوا کی پوانی تکلیف کیلئے
For Chronic Tympanites.

بعض جانور میں نظام ہضم کی کمزوری، معدہ کی تیزابیت، بادی خوراک اور دیگر وجوہات کے باعث بھوک کی کمی، ہاضمہ کی خرابی، منہ سے رال اور بد بو اور پیٹ میں اکثر ہوا رہتی ہے۔ جانور تکلیف محسوس کرتا ہے اور تھوڑا تھوڑا گوہر کرتا رہتا ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر رتج و بادی" صبح شام کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔

بیٹ اور جگر کے کیڑوں کیلئے

A Remedy For Intestinal Worms & Liver Fluke.

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "متفرق امراض کیلئے ادویات"

لکڑی، ہڈیاں، گوہر اور کھڑے وغیرہ کھانے کی عادت کیلئے

For Pica of Litter

معدہ اور ہاضمہ کی خرابی اور خوراک میں ضروری اجزاء مثلاً کیلشیم، فاسفورس اور کوبالت جیسے نمکیات کی کمی کے باعث بعض جانور ہڈیاں، چمڑہ، لکڑی، کپڑا اور گوہر وغیرہ کھاتے ہیں اور کمزور ہو کر دودھ اور کارکردگی کم کر دیتے ہیں۔ ایسے جانور کو "اکسیر گندگی چھوڑ" صبح شام ایک ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً آٹھ دس پیکٹس کافی ہیں۔ نیز جانور کی کھری میں نمک کا ڈھیلا رکھیں، ونڈا اور کھل کھلائیں اور جانور کو چرنے کیلئے کھلا چھوڑا کریں۔

مٹی کھانے کی عادت کیلئے

For Pica i.e. Licking earth.

جانوروں میں مٹی کھانے کی عادت ہاضمہ اور معدہ کی خرابی کے علاوہ غذا میں اہم اجزاء اور نمکیات کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو سخت نقصان دہ ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر مٹی چھوڑ" نمبر وار روزانہ ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً چار یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ نیز ایسے جانور کو کھل اور ونڈا کھلائیں۔ کھری میں نمک کا ڈھیلا رکھیں اور چرنے کیلئے کھلا چھوڑا کریں۔

منہ کھر یا موکھر کیلئے

For Foot and Mouth Disease

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "مہلک اور وبائی امراض کیلئے ادویات"

منہ کھر کیلئے حفظ ماتقدم

Prophylactic for Foot and Mouth

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "مہلک اور وبائی امراض کیلئے ادویات"

واہ، موک یا اسہال کیلئے

For Diarrhea

معدہ کی کمزوری، ہیز چارے کی زیادتی، زیادہ کھا جانے اور انہیچن کے علاوہ پیٹ کے کیڑوں وغیرہ کے باعث جانوروں کو واہ یا اسہال کا مرض ہو جاتا ہے۔ جس سے جانور کمزور، ڈنڈا دودھ اور کارکردگی کم کر دیتا ہے۔ ایسے جانور

کو حسب ضرورت "اکسیر واہ کپسولز" چھوٹے جانور کو ایک اور بڑے جانور کو دو کپسولز فی خوراک تیس چار
دیں آرام آنے کے بعد ایک یا دو مرتبہ دیں۔ نظام ہضم کی انفیکشن کی صورت میں "ترباق زہرہ کپسولز" صبح دس
گھنٹہ میں۔ نوٹ۔ اگر واہ کا باعث پیٹ یا جگر کے کیڑے ہوں تو "اکسیر کرم" کھلائیں

وبائی اسہال، موٹ سے حفظ ما تقدم کیلئے

Prophylactic for Diarrhea

واہ روک

اگر واہ کا مرض وبائی صورت میں ہو تو بطور حفظ ما تقدم ہر تندرست جانور کو صرف دو ٹیکس "واہ روک" (ایک صبح ایک
شام) کھلا دیں تاکہ جانور واہ کی بیماری سے محفوظ رہے۔

ہاضمہ اور بھوک بکنی کمی کیلئے

For Indigestion and Inappetence

اکسیر ہضم و بھوک گر نیوٹ

جانوروں میں ہاضمہ کی جملہ خرابیوں مثلاً بھوک کی کمی، بد ہضمی، پیٹ میں ہوا اور طبیعت کی سستی کو دور کرتی ہے اور
بھوک بڑھا کر بفضلہ تعالیٰ جانور کی صحت، دودھ اور کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے۔ چھوٹے جانور کو پانچ گرام اور
بڑے جانور کو دس گرام فی خوراک چار بارہ یا چھ بارہ گھنٹہ کے وقفہ سے کھلائیں۔

(D)۔ مہلک اور وبائی امراض کیلئے ادویات

TREATMENT OF THE FATAL AND EPIDEMIC DISEASES

تشخیص نہ ہو سکنے والے شدید امراض کیلئے

For Undiagnosed Ailments and Emergencies

اکسیر اعظم

جب کسی تکلیف میں مرض سمجھ نہ آ رہا ہو یا متعلقہ دوائی نل رہی ہو اور جانور کو شدید تکلیف ہو "اکسیر اعظم" مرض کی
شدت کے مطابق چند منٹ، گھنٹہ یا چار گھنٹے کے وقفے سے حسب ضرورت کھلائیں۔ بفضلہ تعالیٰ فوری افاقہ ہوگا۔

پیٹ میں ہوا بھرنے (آبھرنے) کی دوا

For Tympany

اکسیر اچھارہ

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "نظام ہضم کے امراض کیلئے ادویات"

پرسوتی بخار اور مولے بکنے بعد انفیکشن کیلئے

For Post Natal Sepsicemia & Infection of Uterus

اکسیر پرسوت

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "امراض افزائش نسل کیلئے ادویات"

پیشاب میں خون آنے، رت موٹرا کیلئے

For Red Water Disease, Babesiosis

اکسیر سرکن کپسولز

سرکن کا سبب ایک پر دوز "بیبیسوزیا" ہے جو چمڑیوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ نیز فاسفورس بیکشیم اور دیگر نمکیات
کی کمی بھی اس کا باعث ہے۔ اس مرض میں جانور کے خون کے سرخ سیلز تباہ ہو کر پیشاب کے ذریعے خارج ہوتے
جس سے پیشاب کا رنگ سرخی یا سیاہی مائل، دبا کا پیارہ یا رگبش بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر سرکن
کپسولز" دو کپسولز فی خوراک دو دو گھنٹہ بعد کھلائیں۔ جب نسبتاً آرام آئے تو چار یا بارہ گھنٹے کے وقفے سے حسب

ضرورت ہوتی ہے۔ نیز اگر سرکن کے ساتھ قبض بھی ہو تو "اکسیر سرکن کپسولز" کی ہر دوسری خوراک کے ساتھ "اکسیر بندش" بھی ایک ایک پیکٹ کھلا دیں۔ سرکن کے مریض جانور کو صبح شام دودھ پلانا اور مقوی قبض کش خوراک دینا بھی بہت مفید ہے۔

گل گھوٹو کیلئے

For Hemorrhagic Septicemia

اس مرض کا بیکٹیریا جانور کے خون میں سخت انفیکشن پیدا کر کے خون کی باریک رگوں کو پھاڑ دیتا ہے، درجسم کو پوری آکسیجن نہیں پہنچتی۔ جانور کو گلے پر سوجن اور بخار ہوتا ہے منہ سے رال بہتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور ڈکارنے کی آواز نکلتی ہے۔ ایسے جانور کو مرض کی شدت کے مطابق حسب ضرورت پندرہ منٹ یا ایک گھنٹے کے وقفہ سے "اکسیر گل گھوٹو" کھلائیں۔ نسبتاً آرام ہو تو چار چار گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ عموماً آٹھ دس پیکٹس کافی ہیں۔

گل گھوٹو کی ویا سے بچالو کیلئے (حفظ مانقہم)

Prophylactic for H. S.

گل گھوٹو روک

گل گھوٹو کی وبا بارش کے موسم میں نمودار ہوتی ہے۔ بیماری سے بچاؤ کیلئے ہر تندرست جانور کو (بطور حفظ مانقہم) صرف دو پیکٹس (ایک صبح ایک شام) "گل گھوٹو روک" کھلائیں۔

کیلشیم اور نمکیات کی کمی سے فالج کیفیت کیلئے

For Milk Fever, Hypocalcemia

اکسیر ملک فیور

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "دودھل جانوروں کیلئے ادویات"

منہ کھریا موکھر کیلئے

For Foot and Mouth Disease

اکسیر منہ کھر

اس متعدی مرض کا باعث ایک وائرس ہے۔ اس کی علامات جانور کے منہ اور پاؤں میں چھالے اور زخم ہیں۔ جانور لنگڑاتا ہے اور کھانا پینا بند کر دیتا ہے۔ منہ سے رالیں بہتی ہیں اور جانور کو بخار ہو جاتا ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر منہ کھر" حسب ضرورت بارہ یا چوبیس گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ عموماً آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ جانور کو کترا ہوا نرم چارم دینا اور پاؤں کے زخموں کی فینائل وغیرہ سے صفائی کریں۔ تاکہ کھیاں وغیرہ بیٹھ کر کیڑے پیدا نہ ہوں۔

منہ کھریا کی ویا سے بچالو کیلئے حفظ مانقہم

Prophylactic For Foot and Mouth Disease

منہ کھر روک

متعدی مرض عموماً نراں یا بہار میں سونیشیوں اور بھیڑ بکریوں میں پیدا ہوتی ہے ہر تندرست جانور کو مرض کے حمل سے بچاؤ کیلئے (بطور حفظ مانقہم) صرف دو پیکٹس (ایک صبح ایک شام) "منہ کھر روک" کھلائیں۔

(E)۔ جلدی امراض کیلئے ادویات

TREATMENT OF THE SKIN DISEASES

جلدی امراض مثلاً خارش جلد
For General Skin Problems

اکسیر جلد

جانوروں میں بیکٹیریا یا فکس اور Mites وغیرہ کے باعث متفرق جلدی امراض مثلاً خارش، ایکزیما اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ جانور خارش کرتا اور جسم کو مختلف چیزوں سے رگڑتا ہے جس سے بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں کھار خراب ہو جاتی ہے اور جانور کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے جانور "اکسیر جلد" نمبردار روز نہ ایک پیکٹ کھلائیں۔ چار سے آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ نیز "کیوریٹو آئل" جلد پر اچھی طرح لگائیں۔ ضرورت ہو تو دس پندرہ دن بعد دوبارہ اکسیر جلد کھلائیں۔ جانور کو صاف ستھرا رکھیں اور صاف پانی سے نہلائیں۔

چیچڑوں اور جوئوں کیلئے
For Ticks and Lice Infestation

اکسیر چیچڑی

صفائی کی کمی، گندے تالابوں میں نہانے، گندے جانوروں کے ساتھ رہنے اور وٹامن B وغیرہ کی کمی سے جانور کا چیچڑیاں اور جوئیں پڑ جاتی ہیں جو جانور کا خون چوس کر اسے کمزور کرتی ہیں اور اس کا دودھ اور کارکردگی کم کر دیتی ہیں۔ نیز جلدی امراض کے علاوہ فالج، سرکن اور بخار وغیرہ کا سبب بھی بنتی ہیں۔ ایسے جانور کو اکسیر چیچڑی نمبردار روز نہ ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً چار یا آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔

تھنوں اور جلد کے زخموں کیلئے
A Healer of Skin and Teats

کیوریٹو آئل

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "دودھل جانوروں کیلئے ادویات"

تھنوں اور ذم وغیرہ کے گلے (موہری) کی دو
For Gangrene

اکسیر گینگرین

گینگرین یا زخم ہے جو بدبودار ہوتا ہے اور خراب ہو کر بڑھتا جاتا ہے۔ کیونکہ جسم کے اس حصہ میں خون کی سپلائی کسی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات زخم پر مسلسل دباؤ، بار بار دھنا، شدید گرمی یا سردی کا اثر، جراثیم کی آلودگی اور کییمیائی اجزاء کا اثر، فیبرہ ہیں۔ جلد کے علاوہ یہ مرض ذم، کانوں کے سروں اور تھنوں وغیرہ پر ہوتا ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر گینگرین" نمبردار روز نہ ایک پیکٹ کھلائیں عموماً آٹھ پیکٹس کافی ہیں۔ زخم پر "کیوریٹو آئل" لگائیں۔ یہ دیکھنے سے چھائیں۔ صاف ستھرا رکھیں اور کوءے اور دوسرے جانوروں سے چھائیں۔

(F)۔ متفرق امراض کیلئے ادویات

TREATMENT OF THE MISCELLANEOUS DISEASE

تشخیص نہ ہو سکے والے شدید امراض کیلئے
For Undiagnosed Ailments & Emergencies

کسیر اعظم

تفصیل کیلئے دیکھیں زیر عنوان "مہلک اور وبائی امراض کیلئے ادویات"

جانوروں کے بخار وغیرہ کیلئے
For Fever Pyrexia

کیور پیٹو (اکسیر بخار)

بخار کی وجہ جراثیم کی انفیکشن، حشرات کا کاٹنا، چوٹ، موسم کی تبدیلی اور چارہ کا اثر وغیرہ ہیں۔ بخار میں جانور کا مہر پتھر بڑھ جاتا ہے، چارہ کم کھاتا ہے اور بے چمن ہو جاتا ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر بخار" مرض کی شدت کے مطابق دو گھنٹے چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے حسب ضرورت کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ انجکشن کافی ہیں۔

رحم یا جسم کے کسی حصے میں انفیکشن اور سورش کھانے
For Septicemia, Metritis, Vaginitis, Mastitis & other Infections

تریاق زہر باد کپسولز

جسم کے کسی حصے میں انفیکشن، سورش اور قحط واقع ہونے کو زہر باد کہتے ہیں۔ یہ علامات جلد کے علاوہ نظام ہضم اور تولید میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ معدہ کی انفیکشن اور ہاضمہ کی خرابی میں جانور کے منہ سے پوتا، سونے کے بعد رحم میں زہریلے مادوں کی وجہ سے پرسوتی بخار، جیر کے کلزے اندر رہ جانے سے انفیکشن و بخار اور قحطوں کی سورش غرض ہر قسم کی انفیکشن میں "تریاق زہر باد کپسولز" چھوٹے جانور کو ایک اور بڑے جانور کو دو کپسولز فی خوراک بارہ سے چوبیس گھنٹہ کے وقفہ سے کھلائیں۔

جسمانی کمزوری اور مشورہ عام کی کمی کیلئے
A Tonic for General Debility

ٹانک گریٹولز

جب جانور میں کسی گھری تکلیف یا بیماری کے بغیر بھوک کی کمی، جسمانی کمزوری اور دودھ کی پیداوار متاثر ہو تو "ٹانک گریٹولز" سے بفضلہ تعالیٰ جانور کی صحت و کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ چھوٹے جانور کو پانچ گرم اور بڑے جانور کو دس گرم فی خوراک صبح و شام دیں۔

ٹک، سٹک، جکڑوا اور گرم سرد ہوا سے کیلئے
For Emaciation & Effects of Cold & Dampness on Skin & Body

اکسیر ٹک کپسولز

مردم نے سردی، تھک یا جسم میں نمایاں کمی سے بعض اوقات جانور کی صحت کڑ جاتی ہے، بار کھڑے جاتے ہیں، جانور کھانا پینا اور چن پھٹا مٹا رہتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے اور اس کیفیت کو ٹک، سٹک یا جکڑوا کہتے ہیں۔ آنتوں کا ایب جی اسات Cooperia بھی اس کا باعث ہے۔ ایسے جانور کو اکسیر ٹک کپسولز دیں۔ ٹک، سٹک، جکڑوا، سردی، تھک، جکڑوا اور گرم سرد ہوا سے کیلئے۔ اگر جانور کو بخار بھی ہو تو "اکسیر جکڑوا" بھی ساتھ کھلائیں۔ (غیر

(F) - متفرق امراض کیلئے ادویات

TREATMENT OF THE MISCELLANEOUS DISEASE

تشخیص نہ ہو سکے والے شدید امراض کیلئے
For Undiagnosed Ailments & Emergencies

اکسیر اعظم

تفصیل یہ دیکھیں زیر عنوان "مہلک اور وبا کی امراض کیلئے ادویات"

جاموروں کے بحار وغیرہ کیلئے
For Fever, Pyrexia

کیوریٹو (آسیہ بخار)

بخار کی وجہ ترشیم کی، پیش، حشرات کا کاٹنا، چوٹ، موسم کی تبدیلی اور چارہ کا اثر وغیرہ میں۔ بخار میں جانور کا ٹھہرنا بڑھ جاتا ہے، چارہ کم کھاتا ہے اور بے چین ہوتا جاتا ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر بخار" مرض کی شدت کے مطابق دو گھنٹے چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے حسب ضرورت کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ ٹیکس کافی ہیں۔

رحم یا جسم کے کسی حصے میں انفیکشن اور سوزش کیلئے
For Septicæmia, Metritis, Vaginitis, Mastitis & other Infections

تریاق زہر باد کپسولز

جسم کے کسی حصے میں انفیکشن، سوزش اور تھن واقع ہونے کو زہر باد کہتے ہیں۔ یہ علامات جلد کے علاوہ نالی منقسم اور تمام قسید میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ معدہ کی انفیکشن اور باضری خرابی میں جانور کے منہ سے پوتا، سونے کے بعد رحم میں رہنے والوں کی وجہ سے پڑتی بخار، جیر کے ٹکڑے اندر رہ جانے سے انفیکشن و بخار اور تھنوں کی سوزش غرض ہر قسم کی انفیکشن میں "تریاق زہر باد کپسولز" چھوٹے جانور کو ایک اور بڑے جانور کو دو کپسولز فی خوراک بارہ سے چوبیس گھنٹے کے وقفے سے کھلائیں۔

جسمانی کمزوری اور نشوونما کی کمی کیلئے
A Tonic for General Debility

ٹانک گرینولز

جب جانور میں کسی ظاہری تکلیف یا بیماری کے بغیر بھوک کی کمی، جسمانی کمزوری اور دودھ کی پیداوار متاثر ہو تو "ٹانک گرینولز" سے بفعلاً توبی جانور کی صحت و کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ چھوٹے جانور کو پانچ گرم اور بڑے جانور کو دس گرام فی خوراک صبح و شام دیں۔

تک، سٹ، تک، جکڑوا اور گرم سرد ہو جانے کیلئے
For Emaciation & Effects of Cold & Dampness on Skin & Body

اکسیر ٹک کپسولز

گرم سرد ہونے، سردی، تھکے یا جسم میں نمکیات کی کمی سے بعض اوقات جانور کی جلد اثر جاتی ہے، بال کھڑے ہوتے ہیں، جانور کھانا پینا اور چلنا پھرنا کم کر دیتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے اور اس کیفیت کو ٹک، سٹ، تک یا جکڑوا کہتے ہیں۔ آنکھوں سے ایک پیراسائٹ Couperia بھی اس کا باعث ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر ٹک کپسولز" دیں۔ پانچ یا بارہ گھنٹے یا دو گھنٹے کے وقفے سے کھلائیں۔ اگر جانور کو بخار بھی ہو تو "اکسیر بخار" بھی ساتھ کھلائیں۔ (بخار

دیجیں "اسیر ٹھونپہ وز کام" (سک تک والے جانور و ملکیت پر مشتعل پانچویں اور چھٹے تھانے پر)

اکسیر چشم

آنکھوں کی سرخی، کینوں اور دیگر تکالیف
Eyes Inflammation and Alergy

آنکھ پر غرض، انفیکشن یا باضمہ کی خرابی اور دیگر وجوہات کے باعث بعض اوقات جانوروں کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، ان سے پانی بہتا ہے اور گید آتی ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر چشم" تھینک کی شدت کے مطابق چار یا پانچ گھنٹے کے وقفہ سے حسب ضرورت کھلا دیں۔ عموماً چھ یا آٹھ ہفتے کافی ہیں۔

اکسیر چوٹ

اندرونی و بیرونی چوٹوں اور تھکن و دھنیں کیلئے
For Injuries and Fatigue

اندرونی و بیرونی ہر قسم کی چوٹوں، ہڈیوں کے ٹوٹنے اور زیادہ کام کرنے سے تھکن اور دھن وغیرہ کیلئے مفصلہ طور پر بہت مفید ہے۔ تکالیف کی شدت کے مطابق "اکسیر چوٹ" چارہ ست، ایک ست، چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے نمبر وار کھلائیں۔ ہڈی ٹوٹی ہو تو ہڈی کو درست جگہ پر بند کر پانی یا پستہ لگائیں اور اکسیر چوٹ ایک ایک ہفتے کے وقفہ سے تین کورس (چار ہفتے کی کورس) کھلا دیں۔ بیرونی زخموں پر "کیورینو آئل" لگائیں۔ نوٹ گھوڑوں میں ریس کی تھکاوٹ کیلئے بہترین دوا ہے۔

اکسیر درد کپسولز

گٹھبیاوی اور جسمانی دردوں کیلئے
For Rheumatic Pains.

گٹھبیاوی دردوں میں جانور کے جوڑے سوچ جاتے ہیں، ان کا نمپر بچ بڑھ جاتا ہے اور درد ایک جوڑے سے دوسرے میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا باعث جوڑوں میں "لورک ایسڈ" کی زیادتی ہے اور اس کی وجہ ہارٹ میں ہینڈا، ٹھنڈ لگنا، غلہ کا زہر اور ٹیکس وغیرہ بھی ہیں۔ ایسے جانور کو "اکسیر درد کپسولز" تھینک کی شدت کے مطابق چھوڑنے جانور کو ایک اور بڑے جانور کو وہ کپسولز فی خوراک ایک یا دوسرے روزانہ دیں۔ آرام آئے تک چار خوراک کا دہیں۔

اکسیر سرن کپسولز

ہاتھوں کی تکلیف سرخ کیلئے
For Stringhalt

یہ مرض مویشیوں کے علاوہ کبھی کبھی گھوڑوں میں بھی ہوتا ہے۔ جانور کو ٹانگ اٹھانے میں دقت ہوتی ہے اور پھر آہستہ سے ٹانگ کو نیچے رکھتا ہے۔ پچھلی ایک یا دونائیں متاثر ہوتی ہیں۔ اس مرض کا تعلق جراثیم مغز درشتیا تک عصب (Sciatic Nerve) سے ہے اس لئے بروقت علاج ضروری ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر سرن کپسولز" دو روزہ کپسولز فی خوراک صبح و شام دیں آرام ہونے پر روزانہ دیں۔ جانور کو سردی اور گرمی سے بچائیں اور آرام (Rest) کرنے دیں۔

اکسیر فالج

فالج اور دھن کی کیفیت کیلئے
For Paralysis or Palsy

فالج کا مرض دماغ اور اعصابی نظام میں خلل کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اگر جانور فالج میں مبتلا ہو جائے تو اس کا زہر کا اثر اور اعصاب پر چوٹ و دباؤ دیکھ سکتا ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر فالج" حسب ضرورت چار یا پانچ ہفتے تک

کے وقفہ سے کھائیں۔ عموماً آٹھ دن تک چھینس کافی ہیں۔ (نیز دیکھیں "اکسیر کب فیور، کسیر پروسٹ، کسیر سرن")

بیٹ اور جگر کے کیڑوں کیلئے

A Remedy for Intestinal Worms & Liver Fluke

اکسیر کرم

گند، پانی پینے، مٹی چاٹنے اور متاثرہ چارہ کھانے سے مختلف کیڑوں کے انڈے اور لاروے جانور کے جسم میں جا کر پرورش پاتے ہیں۔ ان کیڑوں میں معدے اور آنتوں کے درمیان لیور فلوک (جگر کی جوئیں) وغیرہ شامل ہیں جو جانور کو کمزور کر کے اس کا دودھ اور کارکردگی کم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات نچلے جڑے کے نیچے غدود بھی سوج جاتے ہیں جسے لوگ غلطی سے گلہڑ کہتے ہیں۔ ایسے جانور کو "اکسیر کرم" صبح و شام صرف ایک دن پلا دیں خوراک کی دہرائی ایک ماہ کے بعد پھر کریں۔ تاکہ آئندہ بھی کیڑوں کی پیدائش رک جائے۔ نوٹ: "اکسیر کرم" انگریزی دواؤں کے برعکس جانور پر کوئی برا اثر (Stress) نہیں ڈالتی بلکہ یہ جسم کو ایسی تقویت دیتی ہے جس کے باعث قدرتی طور پر کیڑے جسم سے ختم ہو جاتے ہیں اور جسم کے معاون صحت بیکلر یا دغیرہ نہیں مرتے۔

کھانسی اور برانکائٹس وغیرہ کیلئے

For Cough and Bronchitis

اکسیر کھانسی

سانس کی نالی کی سوزش اور نظام تنفس میں کسی جگہ خراش (Imitation) اور انفیکشن یا پھیپھڑوں کے پیراسائٹس وغیرہ کے باعث جانوروں میں کھانسی کی علامت پیدا ہوتی ہے۔ خوراک یا کسی چیز کا سانس کی نالی میں چلے جانا، گرد وغبار اور جراثیم وغیرہ کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے۔ مرض کی شدت کے مطابق جانور کو "اکسیر کھانسی" چار، چھ یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے حسب ضرورت کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ ٹیکس کافی ہیں۔

گرمی، کھمبے، لگنے، لٹکانے

For Heat Stroke and Heat Exhaustion etc.

اکسیر گرمی

گرم موسم، دھوپ، پانی کی کمی اور سخت محنت مشقت سے جانور کے جسم میں زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور جسم سے حرارت کے اخراج کا نظام سست پڑ جاتا ہے۔ جانور تیز تیز سانس لیتا ہے ہانپتا ہے اور خوراک کم کھاتا ہے جس سے جانور کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ مرض کی شدت کے مطابق "اکسیر گرمی" حسب ضرورت ایک گھنٹہ، چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ جانور کو ٹھنڈی اور ہوادار جگہ میں باندھیں، تھلائیں، زیادہ پانی پلائیں اور جانور سے کام نہ لیں۔ (گرم موسم میں جانوروں کو بطور حفظ مانتھم روزانہ ایک پیکٹ "اکسیر گرمی" دیں۔)

بدمزاج ہندی اور غصیلے جانوروں کیلئے

For ill tempered animals

اکسیر مزاج

بعض جانور دودھ دوتے وقت تنگ کرتے اور کودتے ہیں یا آسانی سے دودھ نہیں اٹارتے۔ بعض بیل اور گھوڑے وغیرہ مار تے، اڑی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا بچہ مر جائے تو غم اور غصے کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے جانور کو "اکسیر مزاج" صبح و شام ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ ٹیکس کافی ہیں۔ جن جانوروں کو سدھایا

کے وقت سے کھائیں۔ عموماً آٹھ دس پینس کافی ہیں۔ (نیز دیکھیں "اکسیر ملک فیور، اکسیر پروسٹ، اکسیر مرٹ")
 بیٹ اور جگر کے کیڑوں کیلئے

A Remedy for Intestinal Worms & Liver Fluke

اکسیر کرم

گنداپانی پینے، مٹی چاٹنے اور متاثرہ چارہ کھانے سے مختلف کیڑوں کے انڈے اور لاروے جانور کے جسم میں جا کر پرورش پاتے ہیں۔ ان کیڑوں میں معدے اور آنتوں کے ورمر اور لیور فلوک (جگر کی جو تکلیں) وغیرہ شامل ہیں جو جانور کو کمزور کر کے اس کا دودھ اور کارکردگی کم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات نچلے جڑے کے نیچے غدود بھی سوج جاتے ہیں جسے دگ غلطی سے گلہڑ کہتے ہیں۔ ایسے جانور کو "اکسیر کرم" صبح و شام صرف ایک دن پلا دیں خوراک کی دہرائی ایک ماہ کے بعد پھر کریں۔ تاکہ آئندہ بھی کیڑوں کی پیدائش رک جائے۔ نوٹ: "اکسیر کرم" انگریزی دو یوں کے برعکس جانور پر کوئی برا اثر (Stress) نہیں ڈالتی بلکہ یہ جسم کو ایسی تقویت دیتی ہے جس کے باعث قدرتی طور پر کیڑے جسم سے ختم ہو جاتے ہیں اور جسم کے معاون صحت بیکٹر یا وغیرہ نہیں مرتے۔

کھانسی اور مزاج کاٹھن وغیرہ کیلئے

For Cough and Bronchitis

اکسیر کھانسی

سانس کی نالی کی سوزش اور نظام تنفس میں کسی جگہ خراش (Imitation) اور انفیکشن یا پھیپھڑوں کے پیراسائٹس وغیرہ کے باعث جانوروں میں کھانسی کی علامت پیدا ہوتی ہے۔ خوراک یا کسی چیز کا سانس کی نالی میں چلے جانا، گردوغبار اور جراثیم وغیرہ کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے۔ مرض کی شدت کے مطابق جانور کو "اکسیر کھانسی" چارہ چھ یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے حسب ضرورت کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ پینس کافی ہیں۔

گرمی کے اثر اور لو لگیے کیلئے

For Heat Stroke and Heat Exhaustion etc

اکسیر گرمی

گرم موسم، دھوپ، پانی کی کمی اور سخت محنت مشقت سے جانور کے جسم میں زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور جسم سے حرارت کے اخراج کا نظام سست پڑ جاتا ہے۔ جانور تیز تیز سانس لیتا ہے ہانپتا ہے اور خوراک کم کھاتا ہے جس سے جانور کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ مرض کی شدت کے مطابق "اکسیر گرمی" حسب ضرورت ایک گھنٹہ، چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے کھلائیں۔ جانور کو ٹھنڈی اور ہوادار جگہ میں باندھیں، نہلائیں، زیادہ پانی پلائیں اور جانور سے کام نہ لیں۔ (گرم موسم میں جانوروں کو بطور حفظ مائع روزانہ ایک پیکٹ "اکسیر گرمی" دیں۔)

ہدمزاج صدی اور غصیلے جانوروں کیلئے

For ill tempered animals

اکسیر مزاج

بعض جانور دودھ دوتے وقت تنگ کرتے اور کورتے ہیں یا آسانی سے دودھ نہیں اہارتے۔ بعض بیل اور گھوڑے وغیرہ مارتے، اڑی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا بچہ مر جائے تو غم اور غصے کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے جانور کو اکسیر مزاج صبح و شام ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ پینس کافی ہیں۔ جن جانوروں کو سدھایا (ٹرینڈ کیا) جا رہا ہو ان کیلئے بھی یہ دوا مفید ہے۔

اکسیر نمونیہ وز کام

ٹھنڈ (سردی) لگنے اور نمونیہ وغیرہ کیسے
For Pneumonia and Colds etc

سرد موسم، بھٹکنے، ٹھنڈے پانی اور تیز ہوا سے چارہ وغیرہ سے زکام بخار اور نمونیہ وغیرہ ہو جاتا ہے۔ ایسے جانور کو حسب ضرورت ایک گھنٹہ، چار گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے وقفہ سے "اکسیر نمونیہ وز کام" کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ انجیکشن کافی ہیں۔ جانور کو گرم جگہ باندھیں اور اچھی خوراک دیں۔ (نیز دیکھیں اکسیر ٹنگ کپسولز)

(G) گھوڑوں کی امراض کے لئے ادویات

TREATMENT OF THE DISEASES OF HORSES

آب گیر

آب گیر یا چھاتی بند کیلئے

For Laminitis

یہ مرض گھوڑوں کا ہے لیکن کبھی کبھار مویشی اور بھیڑیں بھی اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس مرض کی وجہ پاؤں میں چوٹ اور انفیکشن کے علاوہ نظام ہضم کی انفیکشن ہے جو طاقتور غذا مثلاً سبز چنے، جئی اور دسے وغیرہ کھانے اور جانور سے کام نہ لینے کے باعث ہوتی ہے جس سے پاؤں کی لیمینا جھلی میں اجتماع خون ہو کر سوزش اور انفیکشن ہو جاتی ہے۔ جانور درد محسوس کرتا اور نکلزاتا ہے ٹمبر بچر بڑھ جاتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے جانور کو "اکسیر آب گیر" تکلیف کی شدت کے مطابق دن میں دو، چار مرتبہ ایک ایک پیکٹ دیں۔ اگر پاؤں پر کوئی ظاہری زخم ہو تو اسے صاف رکھیں اور "کیورینٹوکل" لگائیں جانور کو نرم جگہ پر باندھیں اور آرام آنے تک کام نہ لیں۔

اکسیر کنار (حنس) کنار نظام تنفس کی انفیکشن

Respiratory Infections, Catarrh, Strangles, Bronchitis etc.

کنار گھوڑے، گدھے اور خچر کے علاوہ دوسرے جانوروں کو بھی سردی لگنے، بھٹکنے، گرم حالت میں ٹھنڈ پانی پینے سرد ہونے اور چھوت کے ذریعہ انفیکشن سے ہو جاتا ہے جانور کھانتا ہے، ناک سے مواد بہتا ہے، کھانا کم کر دیتا ہے، ٹمبر بچر بڑھ جاتا ہے اور جڑے کے نیچے خند و سوج جاتے ہیں ایسے جانور کو "اکسیر کنار" مرض کی شدت کے مطابق چار، بارہ یا چوبیس گھنٹے کے وقفے سے حسب ضرورت کھلائیں۔ عموماً چھ یا آٹھ انجیکشن کافی ہیں جانور کو گرم، روشن اور ہوادار جگہ پر رکھیں اور سردی سے بچائیں۔ (نیز دیکھیں اکسیر نمونیہ وز کام، اکسیر ٹنگ کپسولز)

گھوڑوں وغیرہ میں ہڈا اور بیرھڈی وغیرہ کیلئے
For Exostosis i.e Bony Enlargement

اکسیر ہڈا

یہ مرض عموماً زیادہ کام کرنے والے گھوڑوں میں ہوتا ہے۔ پنڈلی یا گھٹنوں وغیرہ ہڈی کے اوپر رائد ہڈی بن جاتی ہے جو بدنما معلوم ہوتی ہے اور گھوڑا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مرض کا جتنی جلدی علاج کیا جاوے اتنا ہی سونڈ ہے "اکسیر ہڈا" روزانہ ایک پیکٹ کھلائیں۔ عموماً آٹھ یا دس انجیکشن کافی ہیں۔

جانوروں کی بہتر صحت اور دیکھ بھال کیلئے ہدایات

TREATMENT FOR DISEASES OF UDDERS AND TEATS

Food

خوراک

ہر جانور کو اس کے کام اور صلاحیت کے مطابق متوازن خوراک دینی چاہیے۔ جانور کو خوراک کم دینے سے اس کی صحت گر جاتی ہے اور زیادہ کھلانے سے وہ مونا ہو جاتا ہے اس لئے بیکار ہو جاتا ہے اور چارہ ضائع ہو جاتا ہے اس لئے جانور کا راشن مقدار میں اور غذائیت کے لحاظ سے مناسب نسبت کا ہونا چاہیے جس سے جانور کا وزن قدر اور دودھ بڑھے گا۔ جانور میں طاقت بڑھے گی اچھا کام دے گا بیمار یوں کا مقابلہ کرے گا اور سردی، گرمی برداشت کرے گا۔

راشن میں جو اناج دیئے جانے چاہئیں وہ بالکل صاف ستھرے تندرست اور غذائیت سے بھرپور ہونے چاہئیں۔ پرانے، کیترا لگے یا آلی (Fungs) گئے نہیں ہونے چاہئیں چارہ تازہ مگر شبنم سے پاک ہونا چاہیے۔ باسی یا گلا سٹرا چارہ جانور کی صحت کیلئے نقصان دہ ہے۔ جانور کی خوراک اور چارے میں یکدم تبدیلی نہیں کرنی چاہیے اس سے دودھ کی پیداوار میں فرق پڑ جاتا ہے۔

کھلی، بنولے، سرسوں، تل، تارا میرا، توریا کی کھلی دودھار گائے بھینس کو کھلانے کے کام آتی ہے۔ ان سے قبض رفع ہو جاتی ہے کیونکہ ان میں کچھ نہ کچھ تیل کی مقدار باقی ہوتی ہے۔ اور جسم میں سیٹ اور انرجی پیدا ہوتی ہے تارا میرا کی کھلی اضلاع، جہلم، کیمیلور، میانوالی، میں دیتے ہیں اس سے خارش کا کم خطرہ ہوتا ہے منج مانت ہلاک ہو جاتے ہیں۔

بنولا :- مکھن کی پیدائش بڑھانے کیلئے بنولا دیا جاتا ہے۔ بنولا گرم پانی میں چار گھنٹے بھگو کر دینے چاہئیں کیونکہ ان کا چھلکا سخت ہوتا ہے گائے بھینس کو بچہ دینے کے بعد چالیس دن تک بنولا نہیں دینے چاہئیں کیونکہ ان سے دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے اور دودھ کے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ چالیس دن تک دودھ بڑھ چکتا ہے پھر بے شک دے دیں۔ یاد رہے کہ ایک آدھ چھٹا تک نمک ہر جانور کو روزانہ ملنا چاہیے یا اتنی مقدار ان کے راشن میں ڈالنی چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک نمک کا ڈالا ان کی کھری میں رکھ دینا چاہیے یا تار میں پرو کر کسی شہتیر سے لٹکا دینا چاہیے تاکہ جانور حسب ضرورت چاتا رہے اور اس کو مٹی کھانے کی عادت نہ پڑے اگر جانور نمک نہ چائے تو نمک کے ڈالے کو پانی سے گیل کر کے اس پر تھوڑا سا آنا ڈال دینا چاہیے تاکہ آنا کے لالچ سے نمک کے ڈال کو چائے چند روز ایسا کرنے سے جانور نمک چاٹنے کا عادی ہو جائے گا۔

وٹامن :- وٹامن کی کمی سے جانوروں کی آنکھوں کی دیکھائی بھی جاتی رہتی ہے وٹامن سبز چارے میں بہت پائے جاتے ہیں۔ گاجر، وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ حاملہ گائے بھینسوں کو ان کا دینا ضروری ہے اگر حاملہ جانوروں کو چارہ نہ ملے تو ان کے بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں اس کا تجربہ کوئٹہ کے ایک فارم میں ہوا ہے۔

گاجر :- گھوڑے کو ایک کلو گاجر روزانہ ملنی چاہیے خاص کر بارس سٹیلین کو۔ اس سے ان کے جگر کو تقویت پہنچتی ہے اور وہ گھوڑوں کی ملائی کیلئے تیار ہو جاتے ہیں گاجر لسانی کے رخ کاٹ کر دینی چاہیے گول گول پیسوں کی شکل میں نہ کاٹیں۔ چونک (گلے میں رکنے) کا خطرہ ہے۔ گھوڑا گاجر کو خوب چباتا ہے گھوڑے کا گاجر چبانا ضرب الضرب ہے گرمی کے موسم میں ایک دو مٹھی ستوا ایک بالٹی پانی میں ڈال کر گھوڑے کو دیئے جائیں۔ گھوڑا اپنے گاؤں کو شکر پیچنے کی اگر گرمی سے سرخ پیستاب آ رہا ہو گا تو صاف ہو جائے گا چوکرا چھا صاف ستھرا مٹی کے بغیر ہو یہ قبض کشا ہے اس میں معدنی اجزاء بھی ہیں گھوڑے، مویشی دونوں کے لئے مفید ہے سردی کے موسم میں گھوڑوں کو ایک پاؤڈر لسی کوفتہ گرم پانی میں بھگو کر دو چھٹانک شکر ڈال کر دی جائے ایک مہینہ تک دیں اس سے گھوڑے فربہ، توانا ہو جاتے ہیں ان کے بال چمکدار ہو جاتے ہیں ان میں لشر (Luster) پیدا ہوتی ہے۔ گھوڑے کو گندم کا دانہ نہیں دینا چاہیے اس کا جگر پر خراب اثر ہوتا ہے۔

پانی

Water

پانی جسم کا ایک اہم جزو ہے۔ دوران خون میں مدد دیتا ہے اوسطاً ایک بڑے جانور کو ایک وقت آٹھ دس گیلن پانی درکار ہوتا ہے۔ پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے گندہ پانی جانور میں بد ہضمی، صحت کی خرابی، پیٹ میں کیرے پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا صاف پانی انسان پیتا ہے ویسا ہی جانور کو دینا چاہیے۔

رہائش

Residence

جانوروں کی رہائش کی جگہ کھلی ہونی چاہیے جہاں تازہ، ہوا مناسب دھوپ کا انتظام ہو۔ موسم کے لحاظ سے گرمی سردی اور بارش سے بچاؤ کا انتظام ہو صفائی کرنے کیلئے مناسب طریقہ کار اور آبی مہیا ہو۔ جانوروں کے بٹھنے کی جگہ کچڑ اور گوبر سے پاک ہونی ضروری ہے تاکہ گندگی گلنے سے جانوروں کے تھنوں کو جراثیم اور بیکٹریا سے انفیکشن نہ ہو جائے۔ پانی اور چارہ کے برتن میں جانور پاؤں نہ ڈال سکیں۔ مویشی فارم کے اندر عام لوگوں کا آنا جانا نہ ہو۔

Preventive

حفاظتی تدابیر

بیمار جانور کا فوری علاج کروانا ضروری ہے۔ وہاں کے دنوں میں حفاظتی ادویات جن کا رسالہ ہذا میں ذکر ہے۔ استعمال کروانے سے بفضلہ تعالیٰ جانور محفوظ رہیں گے۔

مثلاً 1۔ منہ کھر کی وہاں میں بچاؤ کیلئے "منہ کھر روک" استعمال کروائیں۔

2۔ گل گھوٹ کی وہاں میں بچاؤ کیلئے "گل گھوٹ روک" استعمال کروائیں۔

3- واہ کی دوا میں بچاؤ کیلئے "واہ روک" استعمال کروائیں۔

ملاوہ ان میں بیماریوں کیلئے ضروری ادویات کا فارم میں موجود ہونا ضروری ہے تاکہ کسی بیماری کی صورت میں فوری علاج معالجہ ہو سکے۔

افزائش حیوانات

Veterinary Growth

حیوانات کی افزائش و بڑھوتری مالک کیلئے منافع کا باعث ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر مادہ جانوروں میں ہیٹ آنے کے بعد کے بڑید کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور حاملہ کروالینا چاہیے۔ جس سے مالک کو وقت پر پھل حاصل ہوتا ہے اور دودھ بھی رواں ہو جاتا ہے۔ مختلف جانور اکٹھے رکھنے سے ان کی آپس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے نیز چارہ میں بھی بچت ہو جاتی ہے۔ افزائش نسل میں کمی کی وجوہات میں مادہ کا جلد ہیٹ میں نہ آنا چھری رکاوٹ کی وجہ سے رحم کی خرابی، رحم کا یاہر نکالنا، نظام کا پورے طور پر خراب ہونا ایسی امراض ہیں جن کا علاج وقت پر کروالیا جائے تو مادہ جانور آئندہ حاملہ ہونے کیلئے وقت پر ہیٹ میں آجائے گی۔ ورنہ جانور کا ہیٹ پر یڈ گزر جائے گا اور مالک کو پھل حاصل نہیں ہوگا۔

مادہ جانور کے گرم ہونے یا ہیٹ میں آنے کی علامات

مادہ جانور بے چین ہوتی ہے بار بار پیشاب کرتی ہے پیشاب کے بعد لیڈار مادے کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ دوسرے جانوروں کے اوپر ٹاپتی ہے چارہ کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ دودھل جانور دودھ کم کر دیتے ہیں۔ مادہ جانور کا ہیٹ میں رہنے کا وقت اور اگر حاملہ نہ ہو سکے تو دوبارہ ہیٹ میں آنے کا وقت درج ذیل ہے۔

نام جانور	مدت ہیٹ	دوبارہ ہیٹ کا وقت	اوسط دن
گھوڑی	4 تا 9 دن	13 تا 25 دن	21 دن
گائے	10 تا 24 گھنٹے	18 تا 24 دن	21 دن
بھینس	12 تا 20 گھنٹے	18 تا 24 دن	21 دن
بھیڑ بکری	12 تا 24 گھنٹے	12 تا 19 دن	17 دن

حمل کا زمانہ

بھینس	10 ماہ
گدھی	11 ماہ
بھیڑ بکری	5 ماہ

گائے	9 ماہ
گھوڑی	11 ماہ
اونٹنی	12 ماہ

23
CURATIVE The Pioneer of Homeopathic Combination

MORE THAN 50 MEDICINES FOR ANIMALS DISEASES.



CURATIVE VETERINARY (PVT.) LTD.

HEAD OFFICE RABWAH PAKISTAN
(3-B DAVIS ROAD LAHORE) Tel: 041-6211229 Fax: 041-6211229